

# CARACTERÍSTICAS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA

# CARACTERÍSTICAS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA

| SIGNOS Y SÍNTOMAS                | DENGUE  | CHIKUNGUNYA   | ZIKA  |
|----------------------------------|---|---|---|
| MOTIVO DE CONSULTA MÁS FRECUENTE | Fiebre, mialgias                              | Dolor articular, fiebre                                     | Exantema o prurito  |
| FIEBRE                           | Moderada<br>Frecuente<br>Duración: 5 - 7 días | Intensa<br>Muy frecuente<br>Duración: 3 - 5 días            | Leve<br>Muy poco frecuente<br>Duración: 1 - 3 días          |
| EXANTEMA                         | Inicia al 5-7 día<br>No característico        | Inicia al 2° o 3° día<br>No característico                  | Típicamente desde el día 1<br>Máculo-papular, céfalo caudal |
| PRURITO                          | Leve a intenso                                | Leve a moderado   | Moderado a intenso  |
| CONJUNTIVITIS                    | Poco frecuente / Inusual                      | Muy poco frecuente  | Muy frecuente   |
| MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS     | Poco frecuente                                | Poco frecuente<br>(puede ser frecuente y grave en neonatos) | Posible y grave   |
| CEFALEA                          | Intenso y frecuente                           | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| DOLOR RETROOCULAR                | Intenso y frecuente                           | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| POLIARTRALGIAS                   | No se presenta                                | Muy frecuente   | Frecuente   |
| POLIARTRITIS                     | No se presenta                                | Frecuente   | Frecuente   |
| EDEMA DE MANOS Y PIES            | Poco frecuente                                | Frecuente   | Poco frecuente  |
| EVOLUCIÓN A CRONICIDAD           | No se presenta                                | Muy frecuente   | No se conoce  |
| MIALGIAS                         | Muy frecuente e intenso                       | Frecuente moderado-intenso                                  | Poco frecuente  |
| HEPATOMEGALIA                    | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| VÓMITOS FRECUENTES               | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DIARREA                          | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DOLOR ABDOMINAL INTENSO          | Es un signo de alarma                         | No se presenta  | No se presenta  |
| SANGRADOS EN PIEL                | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| SANGRADOS DE MUCOSAS             | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente (cuando se presenta es grave)            | Muy poco frecuente  |
| CHOQUE                           | Es la forma grave más frecuente               | Poco frecuente  | No se conoce  |
| LEUCOPENIA                       | Moderado - Intensa                            | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| PROTEÍNA C REACTIVA              | Normal  | Positiva  | Positiva  |
| HEMATOCRITO ELEVADO              | Es un signo de alarma                         | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| RECuento PLAQUETARIO             | Normal a muy bajo                             | Normal a bajo   | Normal a bajo   |
| CONSIDERACIONES PARTICULARES     | Riesgo de muerte                              | Puede evolucionar a artropatía crónica                      | Riesgo de infección congénita y Guillain-Barré              |

Fuente: Instituto de Medicina Tropical de Universidad Federal de Rio Grande do Norte - BRASIL

|                         |
|-------------------------|
| NO SE PRESENTA          |
| LEVE/MUY POCO FRECUENTE |
| MODERADO/FRECUENTE      |
| INTENSO/MUY FRECUENTE   |
| SIGNO DE ALERTA         |

*La salud... un derecho para vivir bien*

| SIGNOS Y SÍNTOMAS                | DENGUE  | CHIKUNGUNYA   | ZIKA  |
|----------------------------------|---|---|---|
| MOTIVO DE CONSULTA MÁS FRECUENTE | Fiebre, mialgias                              | Dolor articular, fiebre                                     | Exantema o prurito  |
| FIEBRE                           | Moderada<br>Frecuente<br>Duración: 5 - 7 días | Intensa<br>Muy frecuente<br>Duración: 3 - 5 días            | Leve<br>Muy poco frecuente<br>Duración: 1 - 3 días          |
| EXANTEMA                         | Inicia al 5-7 día<br>No característico        | Inicia al 2° o 3° día<br>No característico                  | Típicamente desde el día 1<br>Máculo-papular, céfalo caudal |
| PRURITO                          | Leve a intenso                                | Leve a moderado   | Moderado a intenso  |
| CONJUNTIVITIS                    | Poco frecuente / Inusual                      | Muy poco frecuente  | Muy frecuente   |
| MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS     | Poco frecuente                                | Poco frecuente<br>(puede ser frecuente y grave en neonatos) | Posible y grave   |
| CEFALEA                          | Intenso y frecuente                           | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| DOLOR RETROOCULAR                | Intenso y frecuente                           | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| POLIARTRALGIAS                   | No se presenta                                | Muy frecuente   | Frecuente   |
| POLIARTRITIS                     | No se presenta                                | Frecuente   | Frecuente   |
| EDEMA DE MANOS Y PIES            | Poco frecuente                                | Frecuente   | Poco frecuente  |
| EVOLUCIÓN A CRONICIDAD           | No se presenta                                | Muy frecuente   | No se conoce  |
| MIALGIAS                         | Muy frecuente e intenso                       | Frecuente moderado-intenso                                  | Poco frecuente  |
| HEPATOMEGALIA                    | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| VÓMITOS FRECUENTES               | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DIARREA                          | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DOLOR ABDOMINAL INTENSO          | Es un signo de alarma                         | No se presenta  | No se presenta  |
| SANGRADOS EN PIEL                | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| SANGRADOS DE MUCOSAS             | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente (cuando se presenta es grave)            | Muy poco frecuente  |
| CHOQUE                           | Es la forma grave más frecuente               | Poco frecuente  | No se conoce  |
| LEUCOPENIA                       | Moderado - Intensa                            | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| PROTEÍNA C REACTIVA              | Normal  | Positiva  | Positiva  |
| HEMATOCRITO ELEVADO              | Es un signo de alarma                         | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| RECuento PLAQUETARIO             | Normal a muy bajo                             | Normal a bajo   | Normal a bajo   |
| CONSIDERACIONES PARTICULARES     | Riesgo de muerte                              | Puede evolucionar a artropatía crónica                      | Riesgo de infección congénita y Guillain-Barré              |

Fuente: Instituto de Medicina Tropical de Universidad Federal de Rio Grande do Norte - BRASIL

|                         |
|-------------------------|
| NO SE PRESENTA          |
| LEVE/MUY POCO FRECUENTE |
| MODERADO/FRECUENTE      |
| INTENSO/MUY FRECUENTE   |
| SIGNO DE ALERTA         |

*La salud... un derecho para vivir bien*

# CARACTERÍSTICAS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA

# CARACTERÍSTICAS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA

| SIGNOS Y SÍNTOMAS                | DENGUE  | CHIKUNGUNYA   | ZIKA  |
|----------------------------------|---|---|---|
| MOTIVO DE CONSULTA MÁS FRECUENTE | Fiebre, mialgias                              | Dolor articular, fiebre                                     | Exantema o prurito  |
| FIEBRE                           | Moderada<br>Frecuente<br>Duración: 5 - 7 días | Intensa<br>Muy frecuente<br>Duración: 3 - 5 días            | Leve<br>Muy poco frecuente<br>Duración: 1 - 3 días          |
| EXANTEMA                         | Inicia al 5-7 día<br>No característico        | Inicia al 2° o 3° día<br>No característico                  | Típicamente desde el día 1<br>Máculo-papular, céfalo caudal |
| PRURITO                          | Leve a intenso                                | Leve a moderado   | Moderado a intenso  |
| CONJUNTIVITIS                    | Poco frecuente / Inusual                      | Muy poco frecuente  | Muy frecuente   |
| MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS     | Poco frecuente                                | Poco frecuente<br>(puede ser frecuente y grave en neonatos) | Posible y grave   |
| CEFALEA                          | Intenso y frecuente                           | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| DOLOR RETROOCULAR                | Intenso y frecuente                           | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| POLIARTRALGIAS                   | No se presenta                                | Muy frecuente   | Frecuente   |
| POLIARTRITIS                     | No se presenta                                | Frecuente   | Frecuente   |
| EDEMA DE MANOS Y PIES            | Poco frecuente                                | Frecuente   | Poco frecuente  |
| EVOLUCIÓN A CRONICIDAD           | No se presenta                                | Muy frecuente   | No se conoce  |
| MIALGIAS                         | Muy frecuente e intenso                       | Frecuente moderado-intenso                                  | Poco frecuente  |
| HEPATOMEGALIA                    | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| VÓMITOS FRECUENTES               | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DIARREA                          | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DOLOR ABDOMINAL INTENSO          | Es un signo de alarma                         | No se presenta  | No se presenta  |
| SANGRADOS EN PIEL                | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| SANGRADOS DE MUCOSAS             | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente (cuando se presenta es grave)            | Muy poco frecuente  |
| CHOQUE                           | Es la forma grave más frecuente               | Poco frecuente  | No se conoce  |
| LEUCOPENIA                       | Moderado - Intensa                            | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| PROTEÍNA C REACTIVA              | Normal  | Positiva  | Positiva  |
| HEMATOCRITO ELEVADO              | Es un signo de alarma                         | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| RECuento PLAQUETARIO             | Normal a muy bajo                             | Normal a bajo   | Normal a bajo   |
| CONSIDERACIONES PARTICULARES     | Riesgo de muerte                              | Puede evolucionar a artropatía crónica                      | Riesgo de infección congénita y Guillain-Barré              |

Fuente: Instituto de Medicina Tropical de Universidad Federal de Rio Grande do Norte - BRASIL

|                         |
|-------------------------|
| NO SE PRESENTA          |
| LEVE/MUY POCO FRECUENTE |
| MODERADO/FRECUENTE      |
| INTENSO/MUY FRECUENTE   |
| SIGNO DE ALERTA         |

*La salud... un derecho para vivir bien*

| SIGNOS Y SÍNTOMAS                | DENGUE  | CHIKUNGUNYA   | ZIKA  |
|----------------------------------|---|---|---|
| MOTIVO DE CONSULTA MÁS FRECUENTE | Fiebre, mialgias                              | Dolor articular, fiebre                                     | Exantema o prurito  |
| FIEBRE                           | Moderada<br>Frecuente<br>Duración: 5 - 7 días | Intensa<br>Muy frecuente<br>Duración: 3 - 5 días            | Leve<br>Muy poco frecuente<br>Duración: 1 - 3 días          |
| EXANTEMA                         | Inicia al 5-7 día<br>No característico        | Inicia al 2° o 3° día<br>No característico                  | Típicamente desde el día 1<br>Máculo-papular, céfalo caudal |
| PRURITO                          | Leve a intenso                                | Leve a moderado   | Moderado a intenso  |
| CONJUNTIVITIS                    | Poco frecuente / Inusual                      | Muy poco frecuente  | Muy frecuente   |
| MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS     | Poco frecuente                                | Poco frecuente<br>(puede ser frecuente y grave en neonatos) | Posible y grave   |
| CEFALEA                          | Intenso y frecuente                           | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| DOLOR RETROOCULAR                | Intenso y frecuente                           | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| POLIARTRALGIAS                   | No se presenta                                | Muy frecuente   | Frecuente   |
| POLIARTRITIS                     | No se presenta                                | Frecuente   | Frecuente   |
| EDEMA DE MANOS Y PIES            | Poco frecuente                                | Frecuente   | Poco frecuente  |
| EVOLUCIÓN A CRONICIDAD           | No se presenta                                | Muy frecuente   | No se conoce  |
| MIALGIAS                         | Muy frecuente e intenso                       | Frecuente moderado-intenso                                  | Poco frecuente  |
| HEPATOMEGALIA                    | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| VÓMITOS FRECUENTES               | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DIARREA                          | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| DOLOR ABDOMINAL INTENSO          | Es un signo de alarma                         | No se presenta  | No se presenta  |
| SANGRADOS EN PIEL                | Frecuente                                     | Muy poco frecuente  | Muy poco frecuente  |
| SANGRADOS DE MUCOSAS             | Es un signo de alarma                         | Muy poco frecuente (cuando se presenta es grave)            | Muy poco frecuente  |
| CHOQUE                           | Es la forma grave más frecuente               | Poco frecuente  | No se conoce  |
| LEUCOPENIA                       | Moderado - Intensa                            | Leve a moderada   | Leve a moderada   |
| PROTEÍNA C REACTIVA              | Normal  | Positiva  | Positiva  |
| HEMATOCRITO ELEVADO              | Es un signo de alarma                         | Poco frecuente  | Poco frecuente  |
| RECuento PLAQUETARIO             | Normal a muy bajo                             | Normal a bajo   | Normal a bajo   |
| CONSIDERACIONES PARTICULARES     | Riesgo de muerte                              | Puede evolucionar a artropatía crónica                      | Riesgo de infección congénita y Guillain-Barré              |

Fuente: Instituto de Medicina Tropical de Universidad Federal de Rio Grande do Norte - BRASIL

|                         |
|-------------------------|
| NO SE PRESENTA          |
| LEVE/MUY POCO FRECUENTE |
| MODERADO/FRECUENTE      |
| INTENSO/MUY FRECUENTE   |
| SIGNO DE ALERTA         |

*La salud... un derecho para vivir bien*

